


CIJEPLJENJE



Tablica 1. *Kalendar obveznog cijepljenja*

| DOB | CJEPIVO | NAČIN DAVANJA |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Po rođenju (12-24 h) | BCG i Hepatitis B | Interdermalno Intramuskularno |
| Sa navršenim 1 mjesecom | Hepatitis B | Intramuskularno |
| Sa navršena 2 mjeseca | Di-Te-Per, Polio (Infanrix) HiB | Intramuskularno Intramuskularno |
| U 4. mjesecu | Di-Te-Per, Polio (Infanrix) HiB | Intramuskularno Intramuskularno |
| Sa navršenih 6 mjeseci | Di-Te-Per, Polio (Infanrix) Hepatitis B | Intramuskularno Intramuskularno |
| U 12. mjesecu | MRP | Intramuskularno |
| U 18. mjesecu | Polio, HiB | Oralno Intramuskularno |
| U 5. godini života | Di-Te-Per, Polio | Intramuskularno Oralno |
| U 6. godini života | MRP | Intramuskularno |
| U 14. godini života | Di-Te, Polio (OPV) | Intramuskularno Oralno |
| U 18. godini života | Ana-Te | Intramuskularno |

NADOKNADA PROPUSHTENE DOZE

IMUNIZACIJA
PROTIV TETANUSA,
DIFTERIJE I
PERTUISISA

- Djeca od navršenih 12 mj. do navršene dvije godine života primit će tri doze vakcine s razmakom od mjesec dana između 1. i 2. doze te šest mjeseci između 2. i 3.
- Djeca od navršene dvije do navršene treće godine primaju jednu dozu DTaP-IPV i dvije doze DTaP-IPV s razmakom od mjesec dana od 1. i 2. doze te šest mjeseci između 2. i 3.
- Djeca s navršenih tri do navršenih sedam godina primit će 3 doze kombinirane DTaP-IPV vakcine s jednakim razmakom u dozama kao i prethodno navedene
- Cjepivo se daje u dozi od 0,5 ml, i.m. U deltoidni mišić

NADOKNADA PROPUŠTENE DOZE

IMUNIZACIJA
PROTIV
POLIOMIJELITISA

- Djeca koja su primila 3 doze cjeviva protiv poliomijelitisa, primit će 1 dozu
- Djeca koja su primila 2 doze cjeviva, primit će 2 doze vakcine u razmaku od najmanje 6 mjeseci
- Djeca koja su primila 1 dozu cjeviva ili uopće nisu cjepljena, primit će 3 doze s razmakom od mjesec dana između 1. i 2. doze te 6 mjeseci između 2. i 3. doze
- Cijepljenje djece od 7. do 14. godine života ide sa 3 vakcine s inaktivnim polio virusom (IPV) u razmaku od mjesec dana između 1. i 2. doze te 6 mjeseci između 2. i 3. doze

NADOKNADA PROPUŠTENE DOZE

IMUNIZACIJA PROTIV
HEMIOFILUSA
INFUENCIE

Protokol za nadoknadu cjepiva isti je kao
i za DTaP

IMUNIZACIJA
PROTIV MORBILA,
RUBEOLE I
PAROTITISA

- Obavezna za svu djecu od navršenih 12 mjeseci do navršenih 14 godina života, a obavlja se cjepljenje s 2 doze vakcine
- Prva doza
S navršenih 12 mjeseci; ako se iz bilo kojeg razloga to ne učini, cjepiti se može do navršenih 14 godina
- Druga doza
Obavlja se u 6. godini života . Ukoliko se ne obavi u navedenom roku, dijete treba primiti vakcinu do 14. godine
- Sva djeca u dobi do 14 godina trebaju primiti 2 vakcine za MoPaRu

SPECIFIČNA

IMUNIZACIJA
PROTIV
TUBERKULOZE


- Imunizacija protiv tuberkuloze obavlja se davanjem 1 doze od 0,05 ml ili 0,1 ml BCG vakcine (ovisno o proizvođaču) intradermalno; 12-24 sata po rođenju u lijevi deltoidni predio
- Ako se iz bilo kojeg razloga novorođenče ne cjepi, istovremeno s vakcinom protiv hepatitisa B, cjepljenje treba biti obavljeno u prvom mogućem kontaktu sa zdravstvenom ustanovom, bez obzira na vremenski razmak
- Cjepljenje djece s navršениh 12 mjeseci do 5 godina, koja prethodno nisu cjepljena, obavlja se davanjem 1 doze od 0,1 ml BCG vakcine

IMUNIZACIJA PROTIV HEPATITISA B

- Cijepljenje novorođenčadi vrši se davanjem 3 doze vakcine od 0,5 ml po shemi 0-1-6 mjeseci
- Cijepljenje protiv hepatitisa B obuhvaća i djecu do 15. godine života koja nisu cijepljena ili koja nemaju dokaz da su cijepljena. Cijepljenje će se obaviti po istoj shemi kao i za novorođenče
- Propuštena vakcina ne treba se ponavljati već se nastavlja dok se ne prime sve 3 doze
- HBsAg pozitivne majke
Osim aktivne zaštite vakcinom po shemi 0-1-2-12 mjeseci, potrebno je istovremeno 1. dozom vakcine, ali na različita mjesta, aplicirati odgovarajuću dozu humanog hepatitis B imunoglobulina

SPECIFIČNO

POSTEKSPOZICIJSKA
VAKCINACIJA
PROTIV TETANUSA




PROFILAKSA

POTREBA ZA
AKTIVNOM I
PASIVNOM
IMUNIZACIJOM

Tabela 1. Postekspozicijska profilaksa tetanusa

| Podaci o ranijem vakcinisanju protiv tetanusa (vaccine koja sadrže tetanus komponentu) | Čista, manja rana | | Sve druge rane* | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|--------|
| | Tetanus | HTIG | Tetanus | HTIG |
| Manje od 3 doze ili je nepoznato | DA | NE | DA | DA |
| 3 ili više doza | NE** | NE | NE*** | NE**** |

- ❖ Ako je poznato da odrasla, ozljeđena osoba, nije nikad ranije primila 3 doze vakcine, potrebno je primiti cjepivo po shemi 0-1-6-12 mjeseci
- ❖ Za pacijente mlađe od 7 godina preporučuje se cijepljenje s DT, DTaP vakcinom, a za starije od 7 godina samo DT vakcina
- ❖ Osobe s većom kontaminiranom ranom trebaju primiti 250 i.j. HTIG
- ❖ Kod dubokih kontaminiranih rana preporučuje se HTIG od 500 i.j.



- ❖ Osobe koje su primile 3 ili više doza, a od kojih je prošlo > 10 g., potrebno je docjepiti s 1 dozom ana-Te cjepiva od 0,5 ml i 250 i.j. HTIG
- ❖ 5-10 g. od zadnje cijepljenja; docjepiti s 1 dozom ana-Te od 0,5 ml
- ❖ < 5 g., **nije** potrebna postekspozicijska profilaksa

