

## Prikaz slučaja

### Gastroenterologija- liječenje H.pylorii kod djece i adolescenata

Djevojčica S.G. u dobi od 12 godina dolazi u pratnji roditelja u vezi liječenja pozitivnog nalaza H.pylorii u stolici. Naime, djevojčica se unatrag 2 mjeseca žali na bolnost u području pupka, bez prisutnosti alarmantnih simptoma.

Nalaz po sustavima uredan. Uvidom u laboratorijske nalaze nalazimo sve uradjene pretrage u referentnom rasponu. Nalaz stolice na H.pylorii pozitivan. (Nalaz iz privatnog laboratorija-roditelji uradili na svoju ruku)

Dg: Funkcionalna abdominalne bol

Th: Savjet o ishrani- izbjegavati UH, mlijeko, slatkiše, pekarske proizvode, masti , kofein i veće količine obroka

Pantoprazol tbl a 20 mg 1x1 natašte

Kontrola za 4 tjedna

Zaključak: Infekcija bakterijom HP je česta, no većina djece je bez simptoma ili simptomi nisu uzrokovanih prisustvom bakterije. Ne preporučuje se tražiti HP kod djece s FD ili drugim funkcionalnih poremećajima, niti se preporučuje testiranje neinvazivnim metodama (nalaz is stolice) i liječenje. Ukoliko je u bioptatima sluznice želuca histoloski ili u kulturi sluznice želuca (također bioptat) izoliran HP, liječnik se odlučuje o eradikaciji s obzirom na stupanj upale ili prisustvo ulceracija.

Smjernice za dijagnozu i liječenje H.pylorii kod djece i adolescenata u prilogu